N°. 13

Rapport sur une taille hypogastrique

L'exposé que nous a fait mr Seaumont de la taille hypogastrique qu'il a pratiqué sur Mr garandel lieutenant des grenadiers au bataillon de l'inde a pondichery, auroit eté beaucoup plus satisfaisant, s'il nous eut fait part des motifs qui l'ont determinés a pratiquer cette operation de preferance a l'appareil lateral, qui d'apres le detail qu'il nous a donné des accidens qui accompagnoient cette maladie, paroissoient indiquer cette derniere methode, puisque la vessie sur laquelle il se proposoit d'operer, etoit depuis tres long temps en suppuration, qu'elle etoit racornie et consequa=ment tres peu spacieuse et que la pierre qu'elle contenoit, etoit immobilement fixé dans le coté droit de ce viscere ce qui luy a fait croire qu'elle pouvoit y etre enkistée. toutes les considerations d'apres lesquelles Mr Seaumont auroit du ce me semble en chirurgien instruit se decider pour l'appareil lateral, ne sont cependant point empechez de faire une operation, qui d'apres les preceptes

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 34 n°10

queèn ont donné les habiles Chirurgiens qui l'ont
pratiqués, tels que Mrs douglas, Cheselden, middleton,
macgil, morand et autres, pouvoit non seulement offrir
des difficultes insurmontables, mais pouvoit encore devenir
meurtrière. en effet les grands Chirurgiens que je viens
de citer, s'accordent tous a dire que lorsque la vessie
supure et quelle est racornie au point de nêtre pas
assé spacieuse pour contenir une suffisante quantite
de liquide pour que le viscere puisse s'élever audessus
de l'arcade que forment les os pubis, cette methode ne
doit point etre pratiquée, parceque'on coureroit pour lors
le risque d'ouvrir le bas ventre en incisant la portion du
peritoine qui separe la vessie d'avec cette cavité, et que
l'épanchement urineux dont cet accident pouroit etre suivi
pouroit causer la perte du malade. ils disent de plus
que la vessie etant ulcerée, l'incision que l'on fait au col
de ~~ce~~ viscere par le grand appareil (on ne connoissoit
point pour lors l'appareil lateral) offre plus de
declivité a la supuration qui en se rassemblant
toujours au bas fond de la vessie, doit en sortir pour lors
avec la plus grande facilité, ce que l'on obtiendroit
point aussi aisement par l'incision que l'on est obligé

de faire en pratiquant le haut appareil. toutes
les raisons ainsi que quelqu'autre qu'il auroit été
trop long de deduire dans un rapport m'engagent
a conclure que Mr Seaumont a été beaucoup plus
heureux que sage dans le choix ~~qu'il a fait~~ du moyen
qu'il a employé, pour guerir son malade.

a paris le 27 mars 1777 Majault

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE